

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十五 明 周王朱橚 撰

積聚門

寒癖 附論

寒癖者有癖積在左脇下遇寒即痛是也此由飲冷過度停積不消能使氣道升降胃臟和調則飲食消化陳寒癖積亦自去矣寒癖之為病是飲水停積脇下痞強是也因遇寒即痛所以謂之寒癖脉弦而大者寒癖也

方

白朮丸

出聖濟
總錄

治冷癖氣因服熱藥發熱心驚虛悸

下冷上熱頭風嘔逆

白朮

陳橘皮

各半兩

白芷

三分

防風

芎藭

吳茱

萸山芋

厚朴

桂皮

去粗

大麥蘖

乾姜

防

葵

甘草

茯神

人參

各一兩

右為末鍊蜜和丸如梧子大每日空心溫酒下二十

丸

白朮丸

出聖濟
總錄

治久寒宿癖心腹刺痛痰逆嘔吐飲

食不消不利羸瘦

白朮

吳茱萸

各一兩

桔梗

當歸

赤茯苓

各一兩

乾姜

二兩桂皮去粗

附子

細辛

生地黄

椒甘

草

各一兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心溫酒下二

十九

桔梗丸

出聖
惠方

治寒癖氣發即脇下痛引膀胱裏急氣

滿不下食

桔梗

兩一

枳殼

兩二

人參

兩一

鱉甲

兩一

吳茱萸

當歸

兩一

桂心

分三

白朮

兩一

大麥蘖

半一

乾姜

兩一

青橘皮

兩一

川

大黃

兩二

右件為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服

以溫酒下二十九日三四服

千金丸

出聖濟
總錄

治寒癖宿滯食飲不消

丹參

兩半

乾姜

兩二

附子

人參

戎鹽

兩各

半夏

錢一

半
大黃二兩 苦參 桂去粗皮各半兩 石膏二兩 巴豆三十枚

右為末再同研勻鍊蜜和丸如小豆大每食後溫酒

下三九

葫蘆巴豆丸出聖濟總錄 治寒癖留滯不消

葫蘆巴 補骨脂各一錢 木香 懷香子各一分 棟實

半兩 硃砂研一錢 銅綠一錢 五靈脂 膩粉研各一分 草烏頭

半兩 巴豆二錢

右搗研為末用薑蔥汁和丸如豌豆大看虛實炒鹽

酒下三五丸空心服

白朮丸

出聖惠方

治寒癖氣腹脹不思飲食四肢少力

白朮

一兩

甘草

半兩

厚朴

一兩

訶梨勒

一兩

陳橘皮

一兩

芎藭

桂心

一分

大麥蘖

一兩

乾姜

三分

人參

三分

右件為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服生薑棗湯下三十丸日三四服

大沈香煨姜丸

出聖濟總錄

治寒癖積氣疼痛下痢

沈香

一兩半

硃砂

木香

各半兩

附子

一枚

黑三稜

鷄

瓜三稜 京三稜 青橘皮

各半兩

右搗研為末酒煮麵糊和丸如小櫻桃大每服用水
姜一塊剉作甕子入藥一丸以濕紙裹煨令香熟安
地上出去火毒少時細嚼鹽湯下

吳茱萸丸

出聖惠方

治久寒癖積胸脇痞滿心腹堅硬短

氣嘔逆手足厥冷腰背引痛

吳茱萸

一兩附子

半兩厚朴

白礬

人參

半夏

枳實

乾姜

炮

桂心

各三分

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下一方有甘草無白礬

木香丸

出聖濟總錄

治寒冷癖積虛中積滯及下痢心腹

疼痛

木香

硃砂

各半

附子

高良姜

胡椒

各一

硫

黃

半巴豆

二十粒

右為末再同研勻用粟米飯和丸如菉豆大每服五丸煎乾柿湯下臨臥服

枳實湯

出聖濟總錄

治寒癖飲食不化下虛滿如水狀

枳實

白朮

各一兩

半夏

前胡

各二兩

桂

去粗皮半兩

甘

草

一兩

赤茯苓

二兩

右粗搗篩每服五錢以水一盞半生姜一小塊拍碎同煎至八分去滓溫服空心日午臨卧各一服

烏頭丸

出聖惠方

治寒癖氣結澁不通繞臍切痛宜服

川烏頭

三分

甘草

半兩

甜葶藶

三分

川大黃

三分

芎藭

半兩

赤

芍藥

半兩

桂心

半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子
大每服不計時候以溫酒下三十丸

露宿丸

治大寒冷積聚方

原本
闕方

丁香丸

出聖濟
總錄

治寒癖積塊

丁香

沈香

附子

硃砂

各半
兩

陳橘

末三
兩

右除硃砂陳橘外搗羅為末用木瓜一枚大者破開
去穢入硃砂於木瓜內甑上蒸爛次入諸藥末都研
看軟硬次入陳橘末為丸如梧桐子大每服五丸茶

湯下或酒嚼下如要疎轉可服十丸小兒一丸

巴豆丸

出肘後方

治寒癖積聚

巴豆

三十枚

杏仁

五十枚

桔梗

皂莢

藜蘆

各二兩

右件搗羅為末拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服食前米飲下一丸日三次欲利者服二丸

療腹中冷癖水穀陰結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉

逆害飲食方

大黃

三兩

甘草

二兩

蜜

一斤

棗

二十枚

右切以水三升先煮三物取一升七合去滓內蜜再上火煎令烱分再服忌海藻菘菜

祕皂莢丸

出聖濟總錄

治寒癖虛冷久積成塊進食化痰

解風祕

皂莢

去黑皮

肉蓯蓉

酒浸

白芷

附子

各一兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒熟水任下空心食前服如關膈不利者服此便通快療腹中冷癖水穀陰結心下停冷兩脇痞滿按之鳴轉

逆害飲食方

大蟾

腹中物

芒硝

一升五合

右以水七升煮取六升一時頓服一升若未下更服

一升中人七合羸小五合得下者止後好將養之

出肘

後方

治寒癖宿食久飲不消大便秘

右用巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜研令大熟
合酒微火煎成膏丸如豌豆大每服一丸水下欲吐

者服二九

治久寒癖積胸脇痞悶心腹堅硬短氣嘔逆手足厥冷
腰背引痛

右用茱萸八兩消石一斤以酒五升合煮取四升先
服一升不痛者止勿再服之下病後好將養之

出肘
後方

又方

出肘
後方

右以大黃八兩葶藶四兩芒硝四兩熬令汁盡熟搗
蜜和丸如梧桐子大食後三丸稍增五丸

又方

出肘後方

右用貝母二兩桔梗二兩礬石一兩巴豆一兩去皮
心生用搗千杵蜜和丸如梧子大一服二丸病後少
少減服

又方

出肘後方

右用茯苓一兩茱萸三兩搗蜜和丸如梧子大服五
丸日三服

掌中春 治肚腹癖積手足厥冷筋骨疼痛熨之自愈

針砂

三兩

礞砂

三兩

白礬

六錢

右為細末研勻以砂銚盛酒醋炒熱紙裹再以手帕裹煨冷痛處如極熱略住再熨直至藥無力覺冷方住

溫胃丸

出聖濟總錄

治冷癖醋心嘔逆宿食不消中酒後

腸臟雷鳴時發腹痛一切虛冷等

吳茱萸 陳麴 陳橘皮 白朮 人參 桂

去粗

皮 熟地黃

甘草

各一兩

右為末鍊蜜和丸如梧子大空心米飲下十丸

酒癖附論

胃弱之人因飲食過多酒性熱使渴而引飲遇氣道否
澁酒與飲俱不化停在脇肋結聚成癖其狀按之有形
或按之有聲脇下弦急脹滿或致痛悶肌瘦不能食但
因酒得之曰酒癖夫酒癖者由飲酒多食魚膾之類腹
內痞滿因而成渴又飲水氣與食結聚兼遇寒氣相加
所以成癖氣停積成於脾胃脾胃得癖氣不消化故令

宿食不消腹內脹滿噫氣酸臭所以謂之酒癖宿食不消也

方

木香丸

出瑞竹堂方

治酒食過傷停飲消積寬膈快脾

丁香乳香

木香

麝香

安息香

沈香

各錢

半藿香

二錢半

青橘皮

陳皮

檳榔

訶子皮

京三稜

蓬莪朮

肉豆蔻

各一兩

桂

半兩

細墨

半兩

猪牙皂莢

一兩七錢

巴豆

右味用陳米四兩與皂莢墨巴豆一處炒令米黃用
重紙裹候冷同前藥碾為細末白麪糊為丸如黃米
殼大每服五七丸至十丸食後姜湯送下如利服一
十五丸利三二行勿多服數

大枳殼丸 治一切酒食所傷胸膈痞悶脇肋脹滿腹
中疼痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並
宜服此

百種丸 治調順三焦理治痞氣去積聚酒癖癥瘕

青皮 陳皮 神麴 蘿蔔子 荊三稜 蓬莪

茂 麥蘖 各二兩 益智仁 雷丸 各一兩 枳實 四兩 牽牛

兩三

右為細末水麴糊丸如梧桐子大每服十五丸食後
生薑陳皮湯送下

鯨甲大黃丸

出聖濟總錄

治宿食酒癖

鯨甲 大黃 吳茱萸 各二兩 硃砂 半兩 陳橘皮 白

木 木香 肉豆蔻 枳殼 京三稜 各一兩

右十味搗羅後六味為末將前蠶甲煎搜和丸如梧

桐子大每服二十九酒飲任下空心服加至三十九

半夏散

出聖惠方

治酒癖宿食不消胸心脹滿嘔逆不納

飲食小便赤黃

半夏

前胡

各二兩

白朮

一兩

甘草

三錢

茵陳

枳殼

赤茯苓

各一兩

黃芩

兩

當歸

三錢

右件藥為散每服三錢以水一中盞生姜半分煎至

六分去滓不計時溫服

大黃桃仁丸

出聖惠方

治酒癖痰多脇脹氣喘上奔不下

飲食

大黃

桃仁

芎藭

陳橘皮

蜀椒

各一兩

高良

姜

乾姜

小草

各三分

右為細末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服三

十丸粥飲下日三服

水銀煎

治酒癖食塊痰積及血氣血刺血塊陰陽二

毒

水銀

鉛各半兩

膩粉半兩 硃砂

蓬砂各一兩

礞石一分

巴豆

二粒

右除膩粉外合研勻用大棗八枚去核以水調膩粉分填於棗內以濕紙五重逐枚裹之灰火內煨熟去紙并棗皮將棗肉與前藥同研勻每服皂子大一丸安舌上勿嚼用姜棗湯吞下取下積滯効

紫金丸

出聖濟總錄

治酒癖食積逐痛氣

代赭石末

硃砂

巴豆霜

各一兩

木香末

丹砂

末

各二錢七分

膩粉

礞石

各三分

右合研勻細以燒粟米飯為丸如小豆大每服二九

冷橘皮湯下

雄松散 治酒積疸虛勞危困

雄黃

甘草

甘松

木香

大黃

各二錢

丁香

十枚

巴豆

十二枚

右為細末每服半錢清茶調下至一錢臨卧時服微

利米粥理之

吳茱萸丸 治酒癖久積飲食不消面色萎黃四肢無

力宜服

吳茱萸

三分

川大黃

兩三

小草

兩一

白朮

兩一

赤茯苓

兩一

桃

仁

兩一

柴胡

兩一

右件藥為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服粥飲下三十丸日三服

乾姜丸 治酒症癖水不消兩脇脹滿時作嘔吐腹中

如水

乾姜

一兩

枳殼

一兩

陳橘皮

三錢

葛根

一兩

白朮

一兩

甘草

兩半

右為細末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服

三十九丸粥飲下日二服

三稜散 治酒食所傷脾胃胸膈不快腹脚脹滿嘔吐

酸水翻胃脾疼及食積氣塊攻刺腹脇不思飲食日

漸羸瘦又治年高氣弱三焦痞塞常覺妨悶並宜服

之

蓬莪朮

益智仁

京三稜

青皮

各二兩

白茯苓

四甘草一兩

右為細末每服二錢用水一大盞棗一枚擘破鹽少許同煎至半盞溫服不拘時候常服寬胸利膈消酒食和胃一方為末每服一錢少鹽煎吞感應丸治傷食泄瀉候酸臭出盡即脹止

金黃丸 治酒積食積諸積面黃疸積硬塊

京三稜 香附子各半兩 澤瀉二錢半 巴豆四十粒 黍米

粉牽牛各二錢半

右為末用梔子煎湯和丸如菰豆大每服三丸至五丸如心痛艾醋湯下七丸

海藻丸 治酒癖因酒後飲水停留於胸膈之間及兩脇下痛短氣而渴宜服

海藻

一兩

漢防己

一兩

甘遂

半兩

吳茱萸

一兩

川椒

一兩

甜葶

麤

一兩

芫花

一兩

右件藥為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大服以溫酒下七丸日三服

治酒癖食不消化

胡椒

兩半

乾姜

兩半

馬片子

兩半

高良姜

兩半

麥蘖

兩半

陳橘

皮

兩一

右件藥為散每服一錢用脰一具薤白七莖細切以熱酒一中盞沃之空心喫盡

羅漢丸

治一切酒食所傷化痰涎行滯氣消痞痛

見方

本門

消痰飲丸

治酒癖飲酒停痰水食不消化嘔逆不欲

聞食氣腹中水聲宜服

乾姜

一兩

赤茯苓

一兩

白朮

四兩

枳殼

一兩

半夏

一兩

右件藥為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服以粥飲下三十九日三四服

四神散

治酒毒發四肢黃腫積聚成塊行風順氣

甜葶藶

一兩

海藻

一兩

吳茱萸

一兩

陳橘皮

一兩

湯浸

右為末每服一錢以水一盞生姜半分棗一枚擘破同煎至六分和滓溫服

至妙通神丸 治酒癖

乾姜 知母

烏頭

各一兩半 巴豆

兩

右搗羅前三味為末入巴豆同研勻以酒煮麴糊丸如菉豆大每服七丸加至十丸臨卧生姜湯下

酒癖丸 善療男子婦人一切酒食所傷日久成積心腹脹悶不思飲食四肢無力時發寒熱痰涎咳嗽兩脇刺痛頭旋惡心嘔逆不止及酒積停於胃間遇飲即吐久而成癖及肚裏疼每服兩丸食後細嚼燒生

姜溫酒送下傷食食後溫水下心氣痛醋湯下不思
飲食臨冷水送下量虛實加減丸數常服食後一丸
茶酒任下有孕婦人不可服

寒食麴

半兩

神麴

三兩

雄黃

三錢

巴豆

五十粒

右為細末滴水丸如梧桐子大蜜乾用穀糠同藥丸
一處炒令糠焦為度每服二三丸茶酒任下不拘時
候一方有全蝎無神麴丸法同上宜用溫酒在食前
服

治中酒不醒兼有酒食傷

出本草

巴豆

一粒

烏梅

二箇

丁香

三粒

胡椒

五粒

右為細末入飯同杵三二千下為丸如梧子大每服五丸或七丸細嚼生丁香湯下小兒服一丸

聖紅丸 治酒食過傷心腹疼痛痞悶不消

巴豆

二十粒

杏仁

七十枚

鉛丹

一兩半

白麴

四兩

右件先將二味研勻次下丹麴研勻滴水為丸如大豆大每服三四丸新水送下食後服

瞿麥散

出儒門

治酒積

甘遂

半兩

瞿麥

葛根

麥蘖

各一兩

右為細末每服二錢酒調下

麴蘖丸

出危氏方

治酒不消心腹脹滿噫醋吞酸嘔吐不

食脇肋疼痛

神麴

麥蘖

各一兩

黃連

半兩

右為末沸湯搜丸如梧子大每服五十丸食後姜湯

下

又方

出本
事方

治胸膈不快酒食所傷漸成翻胃自今乾

嘔

丁香

巴豆

烏梅

各二
十箇

右三味皆不去油殼并核搗三五千杵成膏入早米飯一兩同搗又二千杵令極細衆手圓如桐子大慢火焙乾淨紙承傾地上出火毒每服五丸或七丸茶酒熱水任下如嘔吐酸水心腹氣痛膨脹者橘皮甘草湯下

消滯丸

出德生堂方

治酒食氣傷心腹痞悶刺痛積滯不

消婦人血氣心腹疼大便秘結

黑牽牛

二兩

香附子

二兩

五靈脂

二兩

右為細末醋糊為丸如豆大每服二十九丸生姜湯下

食後服

白朮丸

出聖惠方

治酒癖氣不消化

白朮

四兩

桂心

二兩

乾姜

二兩

右件藥為末鍊蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每

服食前以粥飲下三十丸

狀元丸 治酒積面黃目青或面目俱黃

寒食麪

三兩

雄黃

三錢

巴豆

六十粒

右為末水丸桐子大每服七丸溫水下溫酒亦可

治酒瘰癧水不消兩脇脹滿時復嘔吐腹中如水聲

川芎

一兩

京三稜

一兩

右為末每服二錢葱白酒調下

桔萸散

出聖惠方

治酒瘰癧下脹滿不能飲食

枯薑實

去殼一兩

神麴末

半兩

右為細散每服二錢葱白湯調下一方用枯薑根葱

白酒下

治酒積面黃黑色腹脹不消

甘遂末

一錢

精猪肉

一兩

右將猪肉細切如泥甘遂末和勻肉一處通作一丸用紙包作一重文武火燒香熟取出細嚼酒送下臨卧服取下酒布袋為驗

治酒積面黃目黃或面目俱黃

用腰子一箇切開連着每邊三刀半總計七刀用芎
根一錢為末糝在腰子內合籠一處每邊火炙三遍
半共七遍用手扯做六塊空心做六塊喫下用米湯
三大口嚥下

半夏散 治五飲酒癖怔忡動氣心下痞滿嘔逆吞酸
背寒中冷身體寒戰心腹注痛不思飲食腹內虛鳴
便往得利胃虛氣弱心下有冷痰者最宜服餌

生姜

十二兩

甘草

八兩

陳麴

二十四兩

丁香

二兩

草豆蔻

二兩半

夏麴

一兩半

陳橘皮

三兩

右為末每服三錢鹽少許沸湯點服不計時

半夏湯 治酒癖胸心脹滿逆害飲食乃至小便赤黃

此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃內痰所致

半夏

一升

生姜

黃芩

茵陳

當歸

各一兩

前胡

枳實

甘草

大戟

各二兩

茯苓

白朮

各三兩

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升分二服

百杯丸 治酒停腹中膈氣痞滿面色黃黑將成癖疾
飲食不進日漸肌瘦如飲酒先服此藥者百杯不醉
亦無諸痰

陳皮

三兩

木香

三錢

廣茂

炮三錢

乾姜

三兩

丁香

五十箇

生薑

一兩甘草

二錢

茴香

三錢

京三稜

炮三錢

縮砂仁

三十箇

白豆

蔻

三十箇

右為細末鍊蜜為丸朱砂為衣每一兩作五丸生薑
湯下細嚼無時

乾姜丸 治酒癖停飲吐酸水

乾姜 芎根 枳殼 橘紅 前胡

兩各半

白朮

半夏 麴 茱萸 甘草

兩各一

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下嘗服此方有効

治酒腫酒積

出澹療方

右用酒白麴為細末滴熟湯為丸米飲吞下

溫脾丸 治久寒宿食酒癖

乾姜

芍藥

蜀椒

各三兩

大黃

八兩一錢

小草

一兩

芎藭

炒黃芩

桃仁

柴胡

各三兩

右搗篩蜜和更搗萬杵丸如大豆許每服十九日二

次忌醋

長葫蘆萬安散

王甯傳此

治酒積

錦文大黃

四兩

檳榔

半兩

地扁蓄

半兩

小茴香

四錢

麦芽

一兩

半瞿麥

半兩

右為細末每服八錢重酒調臨卧服仰卧夜半下惡

毒小兒急驚燈心淡竹葉湯下二錢重婦人血積酒
調下腎氣川楝子湯下淋疾車前子湯下疸疾茵陳
湯下心熱眼疾燈心山梔湯下痔疾枳殼湯下渴疾
葛根湯下

酒積丸

出楊氏方

治酒疾不消心腹脹悶噫醋吞酸噦逆

不食脇肋刺痛

神麴

麥蘖

各一錢

礪砂

一錢

白麴

四兩

巴豆

六枚

黃連

錢一

右件為細末沸湯和丸如梧桐子大每服三十九嚼
煨生姜溫湯下食後服

癖結附論

夫癖結者此由飲水停聚不散復因飲食相搏致使結
聚在於脇下時有弦絙或起脹痛或喘息短氣故云癖
結脉緊實者癖結矣○久癖謂飲水過多水氣壅滯遇
寒熱氣相搏便成癖在於兩脇下經久不差乃結聚成
形段而起按之乃水鳴積有歲年故云久癖

方

桃仁散

出聖惠方

治癖結氣積聚不散

桃仁

一兩湯浸

防葵

一兩

枳殼

三分

赤茯苓

一兩

白朮

三分

赤芍

藥

三分

京三稜

一兩半

桂心

三分

甘草

半兩

鱉甲

一兩

川大黃

兩半

檳榔

一兩

芎藭

三分

當歸

三分

剉

右件藥為散每服四錢以水一中盞入生姜半分煎

至六分去滓每於食前溫服

鱉甲丸

出聖惠方

治癖結脇肋弦急疼痛喘息短氣

鱉甲

三兩

大黃

二兩

赤芍藥

半兩

京三稜

一兩半

當歸

一兩

訶梨勒

一兩半

人參

一兩

桔梗

三分

陳橘皮

一兩

五味子

一兩

木香

三分

枳殼

三分

郁李仁

三兩

右件藥為末鍊蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每於食前以清粥飲下三十丸

檳榔散

出聖惠方

治癖結腹脹滿喘促大小便難宜服

檳榔

一兩

木香

半兩

白朮

三分

陳橘皮

三分

赤芍藥

三分

桑根

皮

二兩

木通

二兩

牽牛

二兩

大黃

一兩

剉

兩

右件藥為散每服三錢以水一中盞生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

曾青丸 療久寒積聚留飲宿食天行傷食者服之二十日愈久服令人延年益壽浩仲堪云扁鵲曾青丸療久癖積聚留飲宿食天行傷寒欬逆消渴隨病所在久病羸瘦老小宜服藥下或吐或下或汗

曾青 朴硝 巴豆 各二分 寒水石 茯苓 川大

黃 附子 各三分

右各異搗下篩巴豆硝石合搗六千杵次內附子搗
相得次內茯苓搗相得次內大黃搗相得次內曾青
搗相得次內寒水石搗相得次內蜜和搗千杵大人
服如大豆二丸小兒五歲以下如麻子一丸三歲如
黍米一丸如服藥用粉粥清下當覆卧令汗出吐下
血發作服二丸霍亂服三丸泄痢不止服一丸可至
二丸一方用曾青三分忌猪肉冷水蘆笋大酢

大黃散

出聖
惠方

治癖結兩脇脹痛

川大黃一兩京三稜一兩鱉甲一兩檳榔一兩木香三分赤芍

藥

三桃仁一兩
分洗浸

右件藥為散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

半夏丸

出聖
惠方

治癖結堅固久不差令人食少

半夏

一兩杏仁一兩狼毒一兩桂心一兩川椒一兩附子三分細

辛

一兩

右件藥為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每

服以生姜粥飲下二十九日三服

中候薑墨丸

出肘後方

療諸癖結痰飲等大良

桔梗

桂心

各四分

巴豆

去皮心

芫花

熬各二分

杏仁

五分

右先搗三燥藥成末別搗巴豆杏仁如膏和合又搗一千杵下蜜又搗二千杵丸如胡豆大每服一丸取利可至二三丸兒生十日欲痘發可與一二丸如黍米大諸服不快體中覺換便服之一兩行利即可服四神丸下之亦佳忌猪肉葱蘆笋

枳實散

出聖惠方

治癖結不能飲食心下虛滿如水者

枳實

一兩半

半夏

一兩半

白朮

一兩半

右件藥為末散每服三錢以水一中盞入生姜半分

煎至六分去滓溫服日三四服

三聖丸

出聖惠方

治癖結心下硬痛

巴豆

五枚

杏仁

二十枚

川大黃

一兩半

右件藥為末入巴豆同研令勻鍊蜜和丸如桐子大

每服食前以粥飲下五丸一方搗篩大黃取巴豆杏

仁別搗如膏和大黃入蜜和丸如梧子大空肚以飲服七丸一日二服漸加以微利下病為度忌生冷油膩小豆野豬魚蘆笋等一方空心溫酒下兩丸

木香分氣丸 治積氣癖塊不消心腹痞結疼痛搶刺如覆杯狀

陳皮 檳榔 各一兩 破故紙 二兩 木香 一兩 黑牽牛 二十

兩

右為末滴水為丸如梧桐子大每服三二十丸生薑

湯下食後臨卧服

磨積食勞丸 治食勞黃病瘦弱年深嗜食生味米麥
鹽土不正之食積久蟲多便生癖塊面體萎黃漸成
虛弱

寒食麪

斤半

巴豆霜

二錢半

雄黃

三錢半

白牽牛

南青

皮 陳皮

各半斤

右為細末和勻水為丸如梧桐子大晒乾每服一九
隨粥飲下日進三服

疰癖羸瘦附論

夫疰癖羸瘦者由寒溫不調臟腑虛冷飲食不化邪氣
與臟氣相傳結聚所生也若久不瘥則經絡痞澁血氣
不和四肢時作寒熱腹中鬱鬱而痛不欲飲食脾胃氣
虛不能榮於肌肉故令羸瘦也

方

羊脂煎

出聖惠方

治疰癖氣四肢羸瘦心神虛煩皮膚乾

燥不欲飲食宜服

羊脂升一牛髓升一川椒兩一桂心兩一人參兩一五味子兩一

半
芎藭兩一乾姜兩一乾地黄兩一遠志兩半生薑汁合二當

歸兩一生地黃升一吳茱萸分三

右件藥搗羅為散先用羊脂牛髓生薑地黄等汁以
慢火煎令沸後入藥末煎鍊成膏收於瓷器中每服
以溫酒調下半匙日三四服

牛膝丸出聖惠方治瘞癖氣不能飲食虛乏羸瘦

牛膝兩三生地黃兩四當歸兩半桂心兩三木香兩一五味

子二兩肉蓯蓉三兩神麴末三合大麥蘖二合白朮一兩半人

參一兩半白茯苓三兩陳橘皮二兩檳榔一兩

右件藥為末鍊蜜和搗二百杵丸如梧桐子大每日空心以溫酒下三十丸晚食前再服

附子丸

出聖惠方

治瘧癖氣多吐水面色萎黃心肋脹痛

不欲飲食四肢羸瘦宜服

附子

四兩

白朮

三兩

陳橘皮

一兩

吳茱萸

一兩

桃仁

一兩

乾姜

半木香

半兩

桂心

三分

川大黃

一兩

神麴

一兩

丁香

三分

草豆

薤一兩

右件藥為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以生姜棗湯下三十丸

白朮丸

出聖惠方

治瘧癖氣攻心肋痛不欲飲食四肢羸

瘦

白朮

三兩

蓬莪茂

三兩

烏藥

半兩

木香

半兩

桂心

半兩

硃砂

半兩

生姜屑

半兩

益智子

三兩

木瓜

半兩

蕪荑

半兩

神麴

二兩

右件藥搗為末用硃砂麴膏和丸如梧桐子大每服

不計時候煎生姜橘皮湯下三十丸

枸杞子丸

出聖惠方

治瘧癖冷氣不能飲食四肢羸瘦少

力

枸杞子

三兩

乾姜

一兩

白朮

一兩

川椒

二合

吳茱萸

三分

陳橘

皮

一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子

大每於食前以溫酒下三十丸

紫苑丸

出聖惠方

治瘧癖氣心腹滯悶面色萎黃日漸羸

瘦

方見久積
癥瘕類

瘕瘕心腹脹滿

附論

夫瘕瘕心腹脹滿者由陰陽不調食飲宿滯積聚成病
蘊結在內氣不宣通邪氣搏於正氣脾胃虛冷故令心
腹脹滿也

方

枳殼散

出聖
惠方

治瘕瘕氣脹心肋急痛食不能下四肢

少力

枳殼一兩桔梗一兩鱉甲一兩人參一兩柴胡五錢檳榔七枚芍

藥三桂心一兩橘皮一兩赤茯苓一兩木香三川大黃一兩

赤芍藥三兩當歸五分

劉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

桃仁散

出聖惠方

治瘧瘵氣心腹脹滿不下食飲胸膈壅

悶喘嗽氣急宜服

桃仁

一兩鱉甲

三川烏頭

三皂莢

半兩枳殼

三白朮

三

桔梗

三分 檳榔

三分 防葵

兩半 紫苑

三分 乾姜

兩半 細辛

兩半 陳

橘皮

一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸如梧桐子

大每服不計時候以粥飲下三十丸

大腹皮散

出聖惠方

治瘕瘕氣腹脇脹滿喘息促急不思

飲食宜服

大腹皮

一兩 赤茯苓

三分 桔梗

三分 牡丹皮

三分 桃仁

兩半 檳

榔

五分 桑根白皮

一兩 枳殼

三分 鱉甲

一兩 郁李仁

兩 川大

黃一兩半

右件藥粗搗為散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

訶梨丸

出聖惠方

治疰癰氣攻脇脹滿心胸不利少思飲食

食

訶梨勒

一兩

桔梗

三分

赤芍藥

半兩

枳殼

二兩

白朮

一兩

赤茯苓

苓

一兩

桃仁

一兩

鰲甲

一兩

桂心

三分

木香

半兩

川大黃

三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子

大每服不計時候以溫酒下三十丸

白朮散

出聖惠方

治瘧瘵冷氣滿不能食

白朮

一兩

訶梨勒皮

一兩

枳殼

三分

陳橘皮

三分

乾姜

三分

炮

人參

一兩

桔梗

半兩

桂心

三分

木香

三分

檳榔

三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗二枚

煎至五分去滓不計時候溫服

半夏散

出聖惠方

治瘧瘵氣急硬滿脹心肋多痛不能食

物氣攻胃背壅悶

半夏

三分

桔梗

一兩

大腹皮

一兩

前胡

一兩

鱉甲

一兩半

枳殼

一兩 人參

三分

檳榔

一兩

赤芍藥

一兩

吳茱萸

半兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中盞入姜半分

煎至六分去滓不計時候溫服

京三稜丸

出聖惠方

治瘕癖氣心腹脹滿不欲飲食

京三稜 木香 肉豆蔻 桃仁 乾姜 青橘

皮 蓬莪茂

各一兩

巴豆

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻鍊蜜和搗五七百

枰丸如梧桐子大每服空心以酒橘皮湯下三九

大通散

出聖濟總錄

治瘧癖積聚腹脹氣逆煩滿嘔逆

沈香 木香 白朮 陳橘皮

湯浸

桑根皮 木通

各一兩 胡椒

錢一 黑牽牛

二兩半

右除牽牛外別搗為末每服一錢入牽牛末一錢五

更初以沸湯點臘茶調熱服仰臥不住以熱茶及熱

粥投取利為効少壯多用牽牛少用藥末老弱多用

藥末少用牽牛

木香三稜丸 治胸膈痞悶心腹脹滿脇肋疼痛飲食

遲化四肢困倦嘔逆惡心口苦無味積滯冷物不思

飲食癥瘕瘰癧堅硬氣塊及小兒傷食

方見本門

積年厭食癥塊

附論

夫厭食者與食癥無異也此皆由臟腑氣虛飲食不節
生冷過度不能消化與臟氣相搏結聚成塊厭伏於腹
胃之間盤牢不移歲月積久漸漸增長故名積年厭食
也

方

硃砂丸

出聖惠方

治積年厭食癥塊及血氣癥塊

硃砂

兩半

青礞石

一分

穿山甲

一分

磁石

一分

京三稜

兩

乾

漆

一分

蝨蟲

五十枚

水蛭

五十枚

巴豆

十五枚

赤石脂

一分

右件為細末入巴豆都研令勻用軟飯和丸如小豆

大每服三丸小兒一丸以燒蒸餅灰湯下一飯時候

取下惡物若是血氣塊當歸酒下不過五服差

五靈脂丸

出聖惠方

治久厭食在腹中成塊不消

五靈脂

兩半

馬牙硝

兩半

木香

一分

阿魏

一分

桂心

一分

硃砂

兩半水銀

一分

膩粉

一分

朱砂

一分

青礞石

兩半

右件藥同研令水銀星盡鍊蜜和丸如酸棗大每服
一丸用棗一枚去核安一丸藥在內以白麪餅子裹
慢火燒麪熟為度去麪將棗并藥細嚼以溫酒一小
盞下空心服之神効

治厭食久不消令人萎黃瘦弱宜服此方

硃砂

兩半

朱砂

一分

甘遂

兩半

京三稜

兩半

川大黃

一分

大蒜

一
分巴豆半麝香一錢

右件藥為末入研令勻用醋煮麪糊丸如菉豆大每服食前以生姜橘皮湯下三丸

木香丸

出聖惠方

治厭食及腹內氣塊不計遠近皆効

木香

兩半

京三稜

兩半

五靈脂

兩半

芫花

兩半

百草霜

兩半

砂

兩半

皂莢

五挺

右件藥為末每服一錢研入不去心膜巴豆一粒每十錢十粒旋旋入香墨濃汁搗三千杵乾濕得宜可

丸即丸如黍米大每服以溫水下五丸看臟腑虛實
加減服疎通後只喫粥一兩日一切氣橘皮生姜湯
下血氣當歸酒下三丸

治厭食在腹中積聚成塊久不消散宜服此方

硃砂一分膩粉一分水銀一分巴豆一分京三稜一分砒霜一分

五靈脂一分

右件藥都為末用棗瓤和丸如豌豆大曝令乾每服
食前以生姜酒下三丸

治久厭食在腹中成塊不消

出聖惠方

巴豆

兩半

青礬石

分一兩

砂

兩半

乾漆

兩半

水銀

分一兩

朱砂

兩半

右件藥都研勻用軟飯和丸如黍米大每服食前以
生姜橘皮湯下三丸

朱砂丸

出聖惠方

治厭食留滞在臟腑久不消化

朱砂

兩半

硃砂

兩半

巴豆

分一兩

硫黃

兩半

芫花

兩一

礬石

兩一

右件藥先以巴豆去皮心瓷瓶內盛之於堂屋北陰
下正子地掘坑埋瓶以盆子合受陰氣七日七夜取

出細研紙裏壓去油其諸藥相和細研如麪後入巴豆更研令勻用醋煮麪糊丸如菉豆大每服空心以溫酒下三丸至五丸以下宿食為度

治厭食癥塊久不瘥方

巴豆

十兩

皂莢

二挺

川烏頭

一兩

芫花

一兩

膩粉

一分

麝香

一分

右件為末研勻鍊蜜和丸如菉豆大每服空心以鹽湯下三丸婦人醋湯下

巴豆丸

出聖惠方

治久厭食令自消化

巴豆

一兩

大麥蘖

三兩

神麴

一兩

香墨

半兩

礞石

一兩

麝香

一兩

右件為末用頭醋一椀於鍋內先入巴豆煎三兩沸後入諸藥煎令稠可丸即丸如麻子大每服空心以生薑湯下三丸至五丸

水銀丸

出聖惠方

治厭食不計年月神効

水銀

半兩

硃砂

半兩

膩粉

一分

定粉

一分

消石

一分

右件藥同研令勻候水銀星盡為度用棗瓤和丸如酸棗大用棗一枚去核安一丸在內以麴裏燒令麴

黃色去麪取藥棗溫水嚼下不過三服差

治厭食癥塊久不差

出聖惠方

膩粉兩粉霜

半一兩

硃砂分

右件藥為末用白麪四兩和作餅子裏藥燒麪熟為度取出更入丁香末一錢膩粉二錢以軟飯和丸如梧桐子大每服空心用炮姜湯下三丸

治厭食不計年月神効

豆豉

錢二

大戟

錢一

膩粉

錢一

右件藥同研令勻如是十年以來厭食夜間冷水調
下一錢至明即取下然後將息十餘日

又方

出聖
惠方

膩粉半錢硫黃半錢

右件藥同研勻細用棗一枚去核內藥入棗內用麪
裹灰火內燒候麪熟為度取去麪用棗藥空心以溫
水嚙下

食不消成癥癖

附論

夫飲水結聚在於膀胱遇冷熱氣相搏因而作癥瘕者
冷氣也冷氣久乘於脾脾得濕冷則不能消穀便致羸
瘦不能食或洩利腹內痛氣力乏弱顏色黎黑是也診
其關脉細微而絕者腹內有癥瘕也

方

白朮丸

出聖惠方

治食不消結成癥瘕

白朮

三分

川大黃

三分

枳殼

三分

厚朴

三分

鼈甲

二兩

當歸

半兩

附子

半兩

乾姜

半兩

防葵

三分

吳茱萸

半兩

右件藥為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以溫酒下三十丸

香墨丸

出聖惠方

治食不消化結聚成癥癖塊頭面浮腫

腹脹不能食

香墨

三分

肉豆蔻

三分

檳榔

三分

甘遂

三分

續隨子

半錢

硃砂

一錢麝香

一錢

巴豆

一分

木香

三分

猪牙皂莢

一錢

右件藥為末入研了麝香硃砂巴豆等更研令勻以醋煮麪糊和丸如菉豆大每服以生姜湯下三九

硝砂丸

出聖惠方

治食不消結成癥癖心腹脹痛

硝砂

一兩

京三稜

兩半

芫花

兩半

猪牙皂莢

兩半

巴豆

兩半

乾

漆

兩半

乾姜

兩半

大戟

兩半

川烏頭

兩半

右件藥搗羅為末入研了藥勻於水中銀鍋子內以頭醋一升半慢火熬候可丸入油單內裹旋丸如菰豆大每服空心臨卧時生姜橘皮湯下三丸

木香丸

出聖惠方

治脾虛不能化穀宿食留滯致成癥癖

木香

兩半

肉豆蔻

兩半

檳榔

兩半

巴豆

二十枚

乾姜

兩半

夏

一兩 一兩 砂分三 陳橘皮一兩

右件藥為末入巴豆硃砂更研令勻醋煮麴糊和丸如菰豆大每服空心以生姜棗湯下三丸

治宿食不消結成堅癥形如杯卵腫硬如石宜服此方

巴豆一兩 杏仁兩半 皂莢二兩 硃砂半兩 芫花半兩 川烏頭

半兩 雄黃一分 乾漆兩半

右件藥為末醋煮麴糊丸如菰豆大每服空心以溫

酒下三丸

檳榔丸

出聖惠方

治食不消成癥癖令人四肢乾瘦不欲

飲食

檳榔

二兩半

川大黃

二兩

白朮

三分

枳殼

三分

木香

半兩

柴胡

一兩 鼈甲

二兩

右件為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以暖酒下三十丸

神麴散

出聖惠方

治食不消化結成癥癖令人羸瘦無力

少食

神麴

一兩

桂心

半兩

甘草

一兩

大麥蘖

一兩

乾姜

半兩

陳橘皮

二分

右件藥為散每服清粥飲調下二錢日三四服

治脾虛不能化穀宿食留滯致成癥癖

木香

三分

蓬莪朮

一兩

京三稜

一兩

巴豆

二十枚

硃砂

三分

右件藥前三味搗為末入後二味更同研令勻用麴

糊和丸如菽豆大每服空心以生姜橘皮湯下三丸

王葦丸

出聖惠方

治食不消化腹中結聚癥塊

消石半兩硫黃半兩白礬半兩硃砂一分

右件藥為末用乾鍋子內文火燒令赤直後乾硬停
火候冷取藥置於濕地以土擁之出火毒一日後取
出細研為末以粳米飯和丸如梧桐子大每服以醋
湯下七丸老少臨時加減

治脾虛不能化穀宿食留滯致成癥癖

芫花一兩神麴一兩巴豆半兩

右件藥都和搗一團用油單裹之旋取丸如菉豆大

每服空心以生姜橘皮湯下三丸

瘕癖不能食

附論

夫瘕癖不能食者由脾胃虛弱為寒氣所乘蓋脾胃者倉廩之官其氣宣通則能傳化糟粕受納水穀瘕癖之人是因寒氣久積腹內不能榮養臟腑脾胃既弱邪氣停滯故虛滿而不能食也

方

桃仁丸 主瘕癖氣漫心脹滿不下食發即更脹連乳

滿頭面閉悶欬氣急者

桃仁

八分 鼈甲

枳實

白朮

各六分

桔梗

檳榔

吳茱萸

防葵

乾姜

各五分

烏頭

三分

芍藥

四分 紫

苑

細辛

人參

橘皮

甘草

各四分

皂莢

三分

右搗篩蜜和丸如梧子大每服十丸加至二十丸忌海藻菰菜猪肉冷水生菜桃李雀肉等

又浸藥酒用下前藥方

紫蘇

牛膝

丹參

紫苑

橘皮

各三兩

生姜

六兩

生地黃

兩四

香豉

升三

防風

兩四

大麻仁

一升五合

右細切絹袋盛以清酒二斗五升浸三宿後溫一盞

用下桃仁丸酒盡更添忌蕪荑

白朮丸

出聖惠方

治瘡癰氣不能食心脇下滿四肢骨節

酸疼

白朮

分三

黃耆

兩一

牡蠣

分三

人參

分三

赤茯苓

兩一

川烏頭

分三

乾姜

分二

赤芍藥

分三

當歸

分三

訶梨勒皮

分三

細辛

兩半

桂心

兩半

前胡

兩半

甘草

兩半

防葵

兩半

鼈甲

兩一

紫苑

分三

櫟

分三

櫟

榔一兩桔梗半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三十丸

檳榔子丸 主腹內疰癖氣滿胃背痛不能食日漸羸瘦四肢無力時時心驚

檳榔子 龍齒各六分桔梗 當歸 桂心 川烏

頭 前胡 白朮 乾姜 茯苓 神 大黃各四分橘

皮 厚朴各三分甘草 鼈甲 人參各五分

右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服十九丸米飲下日二服加至十五二十九丸酒下忌海藻菰菜豬肉桃李雀肉大醋菹菜生葱等

黃耆丸 療風虛汗不能食腹內有瘕癖氣滿

黃耆

鼈甲

各五分

白朮

茯苓

檳榔子

人參

各六分

白薇

桂心

橘皮

各三分

牡蠣

乾姜

枳

實

當歸

前胡

附子

各四分

右搗篩蜜和丸如梧子大每服十五丸酒下日再服

加至二十丸忌桃李雀肉醋物猪肉冷水葱薑菜等

木香丸

出聖惠方

治瘧癖氣腹痛不能食四肢少力宜服

木香

三分

訶梨勒

黃耆

鼈甲

各一兩

白朮

三分

赤茯苓

苓

一兩三分

桂心

一兩

枳殼

一兩

陳橘皮

當歸

檳榔

各一兩半

五味子

三分

右件藥搗篩為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三十丸

療癥癖瘕氣不能食兼虛羸瘦四時常服方

牛膝 肉苁蓉 各六兩 生地黄 九兩 當歸 遠志肉 白

朮 人參 各三兩 桂心 四兩 五味子 五兩 麴末 五合 大麥蘖

一升 茯苓 六兩

右為散空腹服二錢溫酒調下日二服漸加至三服
或加半夏二兩生姜煮用檳榔飲下或加麥門冬六
兩此方甚宜久服令人輕健忌桃李雀肉生葱蕪荑
醋物牛犬肉

療瘰癧發即兩脇弦急不能食

檳榔子 枳實 人參 白朮 甘草各六分 桔梗

五分 鼈甲 前胡各四分 桂心三分 龍膽草 萎蕤 大

黃各五兩

右搗篩蜜和丸如梧子大每服十丸酒下日二服加至十五二十九丸忌海藻松菜桃李雀肉菹菜生葱猪肉等

桂心丸出聖惠方

治瘧癖氣不能食腹中痛時嗽四肢少

力

桂心

訶梨勒皮

白朮

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令黃熟各

一兩半

右為末每服二錢炒生薑湯或炒生薑酒調下

療瘰癧胸痛時時欬嗽不能食

桂心

細辛

鼈甲

白朮

厚朴

橘皮

防

葵

吳茱萸

附子

乾姜

各五分

右搗篩蜜和為丸如梧桐子大每服十五丸酒下日

二服加至二三十丸忌豬肉冷水桃李雀肉蔥菜醋

物生菜葱等

半夏湯

出聖惠方

主腹內左脇瘕癖硬急氣滿不能食胃

背痛者

半夏

前胡

鼈甲

各一兩

人參

桔梗

枳殼

吳茱萸

各二兩

生姜

四兩

檳榔子

十四枚

右切以水九升煮取二升七合去滓分三服如人行八九里久服一服忌猪羊肉菹菜一方用枳實無枳

殼

人參丸

出聖惠方

治痿痺氣不能食四肢少力

人參

二兩

白朮

三分

枳殼

三分

陳橘皮

半兩

桂心

三分

甘草

半兩

桔梗

半兩

乾姜

三分

右件藥搗篩為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三十丸姜棗湯下亦得

肉豆蔻散

出聖濟總錄

治痿痺胃中寒痺不思飲食

肉豆蔻

枳殼

各三分

蕪荑

吳茱萸

各三分

高良姜

一木香

半兩

生薑

一斤

右為散小麥麪裹之以煆灰火煨令麪黃熟去麪取散每服三錢空心服用冷生姜水調下午後再服

又方

陳橘皮

分三

附子

分三

乾姜

分三

防葵

分三

吳茱萸

分三

鼈甲

分三

一木香
分三

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以生姜棗湯下三十丸

檳榔丸

出聖惠方

治痧癖氣發即兩脇急滿四肢煩悶不

能食宜服

檳榔

一兩枳殼

分三桔梗

分三人參

分三白朮

兩半桂心

兩半柴

胡

一兩陳橘皮

分三川大黃

一兩芎藭

半兩草豆蔻

一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子

大每服不計時候以溫酒下三十丸

桔梗丸

療冷瘕癖氣發急引膀胱痛氣滿不消食

桔梗

枳實

鼈甲

人參

當歸

白朮

各四分

甘草

五分

右搗篩蜜和為丸如梧桐子大每服十九酒下日再服稍加至二十丸忌葱蒜猪肉菹菜海藻松菜桃李雀肉等

鼈甲散

出聖濟總錄

治腹內疰癖積聚心胃刺痛面無顏

色

鼈甲

去裙襴

附子

炮製

木香

白朮

京三稜

煨剉 檳榔

各三分

大黃

微炒桂皮

高良姜

炒

芎藭

各半兩

右為散每服二錢空心溫酒調服

黑神丸

出聖濟總錄

治瘰癧不能食心脇刺痛發作有時

并膀胱小腸冷滯

漆

六兩半生用重湯煮半日令香

陳麴

懷香子

各四兩

木香

剉細椒

紅

丁香

各二兩

檳榔

剉四枚

右六味搗羅為末用漆和丸彈子大取懷香子末十

二兩鋪蓋陰乾并懷香收器中養藥及乾乃去懷香

瓷合盛若腎餘氣小腸膀胱瘕癖七疝下墜五隔血

腸產後諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一丸用

綿灰酒下難產炒葵子四十枚搗碎酒煎濃汁化下
一丸諸疾不過三服

人參丸 主疰癖氣不能食

人參

八分

白朮

枳實

桂心

各六兩

橘皮

四分

甘草

桔梗

各五分

右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服十五丸酒下日二
服加至二三十丸禁生冷猪肉生葱桃李雀肉海藻
菰菜

木香散

出聖濟總錄

治瘧癖積聚氣不能飲食及五隔及

婦人血氣

木香

一分

蓬莪茂

六兩

京三稜

炮

益智

去皮各二兩

陳橘皮

四兩

甘草

三兩

右為散每服二錢以食鹽點湯調服不計時候

白朮湯

出聖濟總錄

治瘧癖疼痛不能飲食

白朮

木香

益智

各一兩

京三稜

三兩

檳榔

剉一兩半

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓不計

時候稍熱服

京三稜丸

出聖濟總錄

治痼癖急痛不能飲食

京三稜

五兩搗末以好醋一椀同熬成膏

蓬莪茂

炮

益智皮青橘

皮

去白各一兩

冬用檳榔

夏用木香

皆一兩半

右四味搗羅為末以京三稜膏和丸菴豆大每服二十丸加至三十丸生姜湯下食後服

京三稜散

出聖惠方

治痼癖氣每發痛不能食

京三稜

三兩微煨剉

益智子

一兩去皮

吳白朮

一兩

木香

一兩

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至五
分去滓不計時候稍熱服



普濟方卷一百七十五

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百七十六

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

滕錄監生臣何延禮

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十六

明

周王朱橚

撰

消渴門

總論

夫三消者本起腎虛或食肥美之所發也腎為少陰膀胱為太陽膀胱者津液之府宣行陽氣上蒸入肺流化水液液達五臟調陽養髓其次為脂膚為血肉上餘為涕淚經循五臟百脈餘為小便黃者血之餘也臊者五

臟之氣鹹者潤下之味也腰腎冷者陽氣已衰不能蒸
上穀氣盡下而為小便陰陽阻隔氣不相榮故陽阻陰
而不降陰無陽而不昇上下不交故成疾矣夫消者消
渴消中消腎也此由少年服乳石熱藥耽嗜酒肉葷辛
熱麵炙煇荒淫色慾不能將理致使津液耗竭元氣受
克熱毒積聚於心肺腥羶并傷於胃腑脾中受熱水臟
乾枯四體尪羸精神恍惚口苦舌乾日加躁渴飲水多
而小便少者消渴也喫食多而飲水少小便赤黃者消

中也飲水味甘隨飲便下小便而白濁腰腿痠瘦者痼
腎也斯皆五臟精液枯竭經絡血澁榮衛不行熱氣留
滯遂成斯疾矣 渴病有三曰痼渴痼中痼腎渴屬
心故煩必致心火散漫渴而引飲經云脈軟散者當病
痼渴諸脈軟散皆氣實血虛也痼中屬脾脾熱則成為
痼中復有三中寒中熱中強中寒中陰勝陽鬱久必為
熱中經云脈洪大陰不足陽有餘則為熱中多食數溲
為寒中陰狂興盛不交精泄則為強中三痼病至強中

危矣。痾腎屬腎盛壯之時，快情縱慾，年長腎衰，多服丹石，所致經云：腎實則痾不渴，而小便自利，名曰痾腎，亦名內痾。痾渴以渴而不利，引飲過甚，言之痾中，以不渴而利，熱氣內痾，言之痾腎，以渴而復利，腎燥不能制約言之。蓋以上盛下虛，心脈多浮，腎脈必弱，故經云：脈洪大，陰不足，陽有餘，則為熱中。即痾熱氣上騰，心虛受之，病屬上焦，謂之痾渴，熱蓄於中，脾虛受之，病熱中焦，謂之痾中，熱伏於下，腎虛受之，病屬下焦，謂之痾腎。

凡三疳肺疳腎疳可治惟有脾疳不可治肺疳熱在上焦可用涼藥如黃連等皆可用此疾多出於飲酒人冬月盛寒多以葱椒鳩鴿煮酒或加食熱麵遂得此疾故可用涼藥解之如脾疳則飲食入腹如湯澆雪隨小便出落於溷僻清渠中凝結如脂日可倍食數餐膚腹日益瘠瘦用熱藥則熱愈甚用涼藥則愈見虛羸故無治腎疳者渴而多飲水小便白濁肌膚雖日瘠瘦然小便不如脾疳之凝結堅硬飲食亦不倍多是腎虛弱心氣

渙散所致故可補心腎去煩熱則其疾可愈 天地自
太虛至黃泉有六位人身自頭至足亦有六位人胃腹
之間自肺至腎又有六位故立天之氣曰金與火立地
之氣曰土與水立人之氣曰風與火故金火合則熱而
清水土合則濕而寒風火合則溫而炎肺最在上為金
主燥清心次為君火主熱肝又次之為風主溫膽又
次之為相火主極熱又次之為濕土主涼腎又次之黃
泉為寒水主寒故肺象天脾腎象地肝膽象人夫土為

萬物之本水為萬物之元水土合德以陰居陰同處乎
下以立地萬物根於地是故水土濕寒若燥熱陽實則
地之氣不立萬物之根索澤而枝葉為枯由是觀之則
五臟六腑四脉百體皆稟受於脾胃行其津液相與濡
潤滋養今醫者故以燥熱之劑養脾胃濕土之氣不亦
舛乎瘠渴本濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太甚更服
燥熱之藥則脾胃之氣竭矣叔世不分五運六氣之虛
實而一槩執熱為實而寒為虛彼但知心火陽熱一氣

之虛實而非臟腑六氣之虛實也。蓋肺本清虛則溫，心本熱虛則寒，肝本溫虛則清，脾本濕虛則燥，腎本寒虛則熱。假若胃冷虛者，乃胃中陰水寒氣濕甚而陽火熱氣衰虛也；非胃土溫氣之本衰，故當溫補胃中陽火之衰，退其陰水寒氣之甚。又如胃熱為實者，乃胃中陽火實而陰水虛也，故當以寒藥瀉胃中之實火而養其虛水。然此皆補瀉胃中虛熱水火所乘之邪，非胃為實者之本也。夫補瀉脾胃濕土之本氣者，潤其溫是補燥。

其溫是瀉土本濕故也凡臟腑諸氣不必腎水獨當寒
心火獨當熱要知每臟諸氣和同宣而平之可也是故
水少火多為陽實陰虛而病熱也水多火少為陰實陽
虛而病寒也其為治者瀉實補虛以平為其道可矣故
治消渴者補腎水之陰虛而瀉心火之陽熱除腸
胃燥熱之甚漸使津液生而不枯氣血利而不澁則病
日已矣 三消者其燥熱一也但有微甚耳余聞古之
方多一方而通治三消消者以其善消水穀而喜渴也

然叔世論脬渴者多不知本其言脬渴者上實熱而下
虛冷上熱故煩渴多飲下寒故小便多出本因下部腎
水虛而不能制其上焦心火故上實熱而下虛冷又曰
水數一為物之本五行之先故腎水者人之本命之元
不可使之衰弱本不堅則枝葉不茂元氣不固則形體
不容脬渴病下部腎水極虛冷者更服寒藥則元氣轉
虛而下部腎水轉衰則上焦心火尤甚而難治也但以
暖藥補養元氣若下部腎水得實而勝退上焦心火則

自然心渴止小便如常而病愈也巧言似是於理實違者也誤已久矣或又謂腎與膀胱屬水虛則不能制火故小便多者愈失之遠矣彼謂水氣實者乃能制火虛則不能制火故陰虛而熱燥其液小便淋而常少陰實陽虛不能制水小便利而常多豈知消渴小便多者非謂此也蓋燥熱太甚而三焦腸胃之腠理怫鬱結滯緻密塞壅而水液不能滲泄浸潤於外榮養百骸故腸胃之外燥熱太甚雖復多飲於中終不能浸潤於外故

渴不止小便多出者知其多飲不能滲泄於腸胃之外
故數溲也 內經有言心肺氣厥而渴者有言肝痺而
渴者有言脾熱而渴者有言腎熱而渴者有言胃與大
腸熱結而渴者有言小腸痺熱而渴者有因病瘧而渴
者有因肥甘石藥而渴者有因醉醢入房而渴者有因
遠行勞倦逼而大熱而渴者有因傷害為胃乾而渴者
有因病風而渴者雖五臟之部分不同而病之所過各
異其為燥熱一也夫有謂心肺氣厥而渴者論曰心於

熱移肺傳為隔痛注曰心熱入肺久而傳化內為隔熱
痛渴多飲也所謂肝痺而渴者痺論曰肝痺者夜以多
驚多飲數小便如脾熱而渴者痿論曰脾氣熱則胃乾
而渴肌肉不仁發為肉痿所謂腎熱而渴者刺熱論曰
熱病者先腰痛脢酸苦渴數飲身熱熱論曰少陰脈實
腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴叔世惟言腎虛不
能制心火為上實熱而下虛冷以熱藥溫補腎欲令勝
退心火者未明陰陽虛實之道也夫腎水為陰而本寒

虛則為熱心火屬陽而本熱虛則為寒若腎陰虛則心火陽實是謂陽實陰虛而上下俱熱明已故氣厥論曰腎氣衰陽獨宣明五氣論曰腎惡燥由腎枯水涸臟氣時發論曰腎苦燥急食辛以潤之夫寒物屬陰能養水而瀉心熱物屬陽能養火而耗水今腎水既不勝心火則上下俱熱柰何以熱藥養腎水欲令勝心火豈不閤哉又如胃與大腸熱結而渴者陰陽別論二陽結為之瘕注曰二陽結胃及大腸俱熱結也腸胃藏熱善瘕水

穀又氣厥論曰大腸移熱於胃善食而瘦而脈要精微
論曰痺成為瘠中善食而瘦如脾痺而渴者數飲而不
得中氣喘而終時發飡泄夫數飲而不得中其大便必
不停留然則瘠渴數飲而小便多者止是三焦燥熱怫
鬱而氣衰也明矣豈可以燥熱毒藥助其強以伐衰陰
乎此真實實虛虛之罪也夫瘠渴者多變聲音瘡癰瘰
癧之數皆腸胃燥熱怫鬱水液不能浸潤於周身故也
或熱而膀胱怫鬱不能滲泄水以妄行而面上腫也如

小腸痺熱而渴者舉痛論曰熱氣留於小腸腸中痛痺
熱焦渴則便堅不得出矣注曰熱滲津液而小便堅矣
如言病瘧而渴者瘧論曰陽實則外熱陰虛則內熱外
內皆熱則喘渴故致飲冷也然陽實陰虛而為病熱法當
用寒藥養陰瀉陽是謂瀉實補衰之道也如因肥甘石
藥而渴者脾病論曰有口乾者病名為何岐伯曰此五
衰氣之所病溢名脾痺痺為熱也脾熱則四臟不稟故
五氣上因也先溢脾熱故脾痺又經曰五味入口藏於

內脾胃為之其精氣津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉而為瘠渴通許虛實論曰瘠痺仆擊偏枯痰厥滿發逆肥實之人膏粱之疾也或言人惟胃氣為本脾胃合為表裏脾胃中州當受溫補以調飲食今渴瘠者脾胃極虛溢宜溫補若用寒藥耗損脾胃本氣虛乏而難治也此言乃不明陰陽寒熱虛實補瀉之道故妄言也豈知腹中論曰帝云夫子數

言熱中瘡中不可服芳草石藥發癰芳草發狂注言多
飲數溲謂之熱中多喜曰癰多怒曰狂芳美味也石謂
英乳及發熱之藥經又曰熱中瘡中皆富貴人也今禁
膏粱是不合其心禁草石藥是病不愈願聞其說岐伯
曰芳草之味美石藥之氣悍二者之氣急疾堅致故非
緩心和人不可服此二者帝曰何以然岐伯曰夫石氣
慄悍熱氣亦然所謂飲一而溲二者當肺氣從水而出
也其水穀海竭矣凡瘡渴便用熱藥誤人多矣故內經

應言渴者皆如是豈不昭晰歟然而猶有惑者諸氣過極反勝已者是以人多誤也如陽極反似陰者是也若不明標本為認似是始終乖矣故凡見下部覺冷兩腋如冰此皆心火不降狀類寒水宜加寒藥下之三五次則火降水升寒化則退然而舉世皆同執迷故處其方必明病之標本達藥之所能通氣之所宜治而無害者可以治其病也以所為標本者先病而為本後病而為標此為病之本末也標本相傳先當救其急也又云

六氣為本三陰三陽為標蓋為標病藏病最急也又云
六氣為胃之本假若胃熱者胃為標熱為本也處其方
者當除胃中之熱是治其本也故六氣乃以甚者為邪
病衰者為正法當瀉甚補衰以平為其養正除邪之
道也酸能收甘能緩辛能散苦能堅鹹能軟酸屬木
也燥金注於散落而木反之溫土主於緩而木勝之故
能然也苦能燥濕而堅與者蓋以凡物燥則堅也甘能
緩苦急而散結甘者土也燥能急結故緩則散也辛能

散主散結潤燥辛者金也金主散落金生水故也況抑
結散則氣液宣行而津液生也臟氣發特論曰腎苦燥
急食辛以潤之開腠理致津液通氣也鹹能軟堅鹹者
水也水潤而柔故勝火之堅矣此五臟之味也其為五
味之本者淡也淡胃土之味也胃土屬地土者地為萬物
之本胃為一身之本澹能滲泄利竅夫燥能急結甘而
能緩之淡為剛土其能潤燥緩其急結令氣通行而致
津液滲泄也故瘠渴之人其藥與食皆宜淡齊至真大

要論曰辛甘發散為陽酸苦漏泄為陰淡味滲泄為陽
五者或散或收或緩或急或燥或潤或堅或軟所以利
而行之調其氣也 凡三痛者內經所謂腎痛也痛渴
等可取生藕汁服之則愈夏月暑毒入心心旺不受邪
熱移於肺肺葉焦津液乾好飲水名曰膈痛宜以冷參
湯進玉壺丸之類效 寒暑之交氣壅不調鼻塞聲重
咽乾煩渴二腑癰閉法當洗心滌其熱去而肺經清潤
渴自止矣宜用洗心散之類 飲酒無度食炎熱過多

邪熱蓄積於胃腑多令煩渴當用龍腦飲之類制其脾
化其滯導其熱也 色欲無節耗損腎元水火不交火
必炎上熏蒸於肺金與火燥渴生飲冷當因其本宜腎
氣八味丸之類若不先固其本又將何以禦其渴哉

診其脉數大者生細小浮者死又沉小者生實牢大者
死有病口乾此病何以得之蓋五氣之溢也名曰脾疸
夫五味入於口藏於脾為之行其精氣溢在於脾令人
口乾此肥美之所發也此人飲不欲食甚者則欲吐下肥

人內熱甘者令人中滿故其氣上溢為消渴也厥陰之
為病消渴氣上衝心中疼熱欲必數食甘美而多肥者令
之不肯止養氣法云人睡眠合卧勿張口久成消渴反
失血色 凡積久飲酒未有不咸消渴然則太寒凝酒
而海不凍明其酒性酷熱物無以加鬱炙鹽鹹之味酒
客耽嗜不離其口入腸之後制不由已飲噉無度咀嚼
將不擇酸鹹積年長夜酣飲不懈遂使三焦猛熱五臟
乾燥木石猶且枯焦在人何能不渴治之安可緩在病

者若能如方節慎旬月可瘳如不愛惜死不旋踵其所
慎者有三一飲酒二房室三鹹食及麵能慎此者雖不
服藥而自可無他不知此者縱有金丹亦不可救瘳渴
之人愈與未愈常須慮有大癰也當預備癰藥以防
之有人病渴利始發於春經一夏服枯樓斗汁得其力
渴漸瘳然小便猶數甚晝夜二十餘行常至三四升極
瘳不減二升也轉久便止漸食肥膩日就羸瘦咽喉唇
口焦燥呼吸少氣不得多語心煩熱兩脚酸食乃兼倍

於常而不為氣力者當知病皆由虛熱所致治法可常
服枯樓汁以除熱牛乳杏酪善於補此治最有益 痼
渴之疾或服五石而致者又有疾久飲酒而致者如解
五石毒者飲粟粥而能止渴並宜服兔絲圓大渴而
加煩熱者枯樓根湯馬通散之數 凡病人兼有燥渴
之證用烏梅枯樓根乾葛甘草宣補丸 凡人生放恣
者衆盛壯之時不自慎惜快情縱慾極意房中稍至年
長腎氣虛竭百病滋生又年少懼不能房多服食石散

真氣既盡石氣孤立日惟虛耗唇口乾燥精液自洩或
小便赤黃大便堅實或渴而且利日夜一石或渴而不
利所食之物皆作小便此皆由房室不節之所致也凡
平人夏月喜渴者由心熱也心熱便汗汗則腎中虛燥
故渴而小便少也冬月不汗故小便多而數也此為平
人之證也名為痛渴但小便利而不飲水者腎實也經
云腎實則消消者不渴而利是也所以服石之人於小
便利也石性歸腎歸腎則實實則能消水漿故利利多

則不得潤養五臟五臟衰則生諸病張仲景云熱結中焦則為腎熱結下焦則為溺血亦令人淋閉不通明知必有患小便利信矣內有熱者則喜渴除熱則止渴熱虛者須除熱補虛則瘥矣

消渴 附論

夫消渴者雖為渴而不小便是由少年服五石諸圓經年歲石勢結於腎中使人下焦虛熱及至年衰血氣減少不復能制於石石勢獨盛則腎為之燥故引水而小

便少也其病變者多發癰疽此由滯於血氣留於經絡不能通行血氣壅澀故成膿也診其脉數大者生細小浮者死又沉小者生實大者死病有口甘者名之為何何以得之此氣之溢也名曰脾痺夫五味入於口藏於胃脾之所為行其氣液在於脾令人口甘此肥美之所發此人必數食甘美上溢為疇渴也

辨六經渴并治

少衛生寶鑑

大陽渴脉浮無汗者五苓散滑石之類皆不作效遂至

引飲過多兩腳浮腫此證不可以為裏熱蓋腎水不上
升心火不降故也須用交感丹為主却以烏梅濃蜜生
姜甘草煎湯嚥之腎水一升心火一降其渴止脚亦不
腫 治上焦膏肓而不欲多食小便清利宜小柴胡白
虎湯或錢氏地骨皮散加芍藥黃芪石膏黃芩桔梗之
類是也 若消渴者倍黃連消中者倍枯樓腎消者加
芒硝六分服鈇丹丸得小便鹹苦如常後恐虛憊者並
宜服肉蓯蓉丸 足太陽者是膀胱之經也膀胱者是

腎之腑也而小便數此為氣盛則消穀大便硬實則為
瘠渴也宜八味腎氣此主之 凡瘠渴者經百日以上
者不得灸刺恐於瘡上漏膿水不歇遂成癰疽羸瘦而
死亦忌有誤傷皮肉若作鍼孔許大瘡者所飲之水皆
於瘡中變成膿水而出不止者必死慎之初得瘠渴者
可依後方灸刺之為佳孫氏云瘠渴者百日外概不許
鍼刺所飲之水皆化為膿水不止者皆死特須慎之又
云仍不誤傷皮肉若小有瘡亦能致死今者既得瘠渴

且未免飲水水入瘡即損人今初得日豈得令其刺
致此誤傷之禍輒將未順其理且俟百日以上或能未
誤初灸之說故不錄灸刺凡灸刺則外脫其氣痠渴皆
是虛疾灸刺特不相宜唯腳氣宜即灸之 夫內痃之
為病當由熱中所致小便多於所飲令人虛極短氣夫
內痃者食物皆消作小便也而又不渴正觀十年梓州
刺史李文博先服白石英既久忽陽道強盛經月餘漸
患渴經數日小便大利日夜百行以來百方治之漸以

增劇四體羸憊不能起止精神惚恍口舌焦乾而卒此
病雖稀甚可畏也利時脉沉細微弱服枸杞湯即效但
不能長愈服鉛丹散亦即減其間將復除熱陽明渴脉
長有汗者白虎涼膈散之類少陽渴脉弦而嘔者小柴
胡加桔樓湯太陰渴脉細不欲飲水思湯不思水者四
君子理中湯主之少陰渴脉沉自利者猪苓湯三黃湯
之類厥陰渴脉微引飲者少少與之滑石治渴本為竅
不利而用之以其燥而能亡津液也天令溫氣太過者

當用之是為犯禁假令小便利或渴或不渴內有濕熱也小便自利而渴者內有禁燥也濕宜滲泄之燥則潤澤之可矣維證有汗而渴者以辛潤之無汗而渴者以苦堅之傷寒食少而渴者當以和胃之藥止之不可用涼藥止之恐復損胃氣不能食也白朮茯苓即是和胃之藥也大陽無汗而渴者不宜白虎湯若汗後脉洪大而渴者宜與之陽明有汗而渴者不宜與五苓散若小便不利汗少脉浮而渴者宜與之人病心肺熱而不渴

者知不在太陽少陰之本而只在標也在標則不渴矣
是在本也

爛金圓

出三因方

治熱中消渴止後將補精血益諸虛解

勞倦去骨節間熱寧心強志安神定魄固臟腑進飲食
免生瘡瘍

大猪肚

一箇

黃連

三兩

蜜

生姜

各二兩研

右先將猪肚淨洗復以葱麴醋椒等洗烘乾用藥同
水酒入銀石器內煮半日漉出黃連洗去蜜酒令盡

劉研為細末再酒調成膏入先洗猪肚內縫定入銀
石器內水熬爛研為膏搜下項藥

人參

二兩

黃耆

四兩

五味子

山藥

山茱萸

杜仲

去皮剉姜汁
拌炒絲斷

石斛

車前子

鼈甲

醋炙

熟地黃

新蓮肉

去皮

當歸

各三兩

槐角子

炒

白茯苓

磁石

各一

兩煨
碎

川芎

一兩

沉香

半兩

兔絲子

五兩

酒浸溫研

麝香

一錢
別研

入

右為末用猪肚膏搜和得所膏少則添熟蜜杵數千

下九如梧桐子大食前溫酒糯米湯任下五十九一

法有白朮

二兩陽起石一兩

茯苓丸

出三因方

治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣

飲過多皆致煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不

茯苓

酒浸

磁石

煨碎

熟地黃

山茱萸

桂心

山藥

炒

牛膝

酒浸

茯苓

黃耆

鹽湯浸

澤瀉

鹿茸

去毛塗酥炙

遠志

去心炒

石斛

覆盆子

五味子

萆薢

破

故紙

炒

巴戟

酒浸

兔絲子

酒浸

龍骨

杜仲

去皮剉姜汁製炒斷

絲各半兩

附子

炮去皮臍箇重六錢

右為末蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心米湯

飲下

丹砂散

出聖濟總錄

治三消病小便頻數皮燥毛焦飲食

雖多肌肉消瘦渴燥引飲

丹砂

研水飛

黃連

去鬚

鐵粉

研

栝樓

各一兩一分

赤石脂

蘆薈

研

龍齒

澤瀉

各三分

胡粉

研

金

研各半兩

牡蠣

煨

分桑螵蛸

十個炙

雞臍脰

五枚蜜炙黃

甘草

一兩半炙

右除別研外搗羅為散再和勻每服二錢用水煎小

麥湯調下每日三服

白朮散

出千金方

治瘡渴陰脉絕胃反而吐食

生白朮

乾地黄

生姜

各二兩

橘皮

人參

甘

草黃耆

遠志

各三兩

桂心

當歸

芍藥

各三兩

大棗

三枚

右咬咀先取屋上瓦三十年者碎如雀腦三升東流

水二石煮取二斗納藥丸汁中煮三升分四服或單飲丸汁亦佳

真珠丸

出仁存方

治心虛煩悶或外傷暑熱內積煩悶

飲過多皆致煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不

知母

一法一兩一分

川黃連

去毛一法一兩一分

苦參

一法一兩一分

鐵鐸粉

一兩一分

一分

元參

一法無

牡蠣

煨一兩一分

硃砂

別研二兩

麥門冬

去心

天花粉

分各半八兩

金箔

銀箔

二百片一法白扁豆煮去皮一兩

右為末煉蜜入生枯樓根汁少許丸如梧桐子大用
金銀箔為衣每服二十九丸先用枯樓根汁下一服次
用麥門冬熟水下病退日二服忌燂酒色次投薤蓉
丸補一方有蘆薈二錢半白扁豆二兩炒

天花丸

出經驗良方

治渴通用

消渴數中消腎病

三焦五臟生虛熱

唯有膀胱冷似冰

嘗思飲水無休歇

小便晝夜不停行

骨冷皮焦心肺裂

本因飲酒炙煇多

四體肌膚淋轉渴

莫教便利白如泔

口苦咽乾舌如血

若如此狀病須危

幸遇神仙談妙訣

黃連

淨三兩童便浸三宿焙

白扁豆

姜製去皮炒二兩

辰砂

白茯苓

苓

牡蠣粉

知母

苦參

天花粉

鐵粉

各半

兩

蘆薈

一分金銀箔

各二十片

右為末取枯樓根生汁和生蜜丸如梧桐子大每服

三十九麥門冬湯送下一方無白茯苓

鐵粉丸

出聖惠方

治瘡渴不問年月深淺困篤者宜服此

鐵粉

二兩研

雞臍脰

一兩微炒

土瓜根

一兩

苦參

三分黃連三分

麥門冬

一兩去心

牡蠣

三分燒為粉

桑螵蛸

三分微炒

金箔

五十片

銀箔

五十片

枯樓根

三分

右為末入研了藥更研令勻煉蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以清粥送下三十九

降心湯

出直指方

治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血

日消

人參

去蘆

遠志

取肉薑汁炒

當歸

去毛

川芎

熟地

去土

白茯苓

苓皮

去黃著

蜜炙去蘆

五味子

去梗

甘草

微炙各半兩

天花粉

一兩

右剉細每服三錢薑棗煎食前服

金英丸

出聖濟總錄

治痢渴

鉛丹

麥門冬

去心焙

牡蠣

煨研如粉

知母

焙各一兩

黃連

去皮

鬚

桔樓根

苦參

各二兩

金箔

一百片

生桔樓

二兩研如膏

銀箔

一百片

右搗羅為末用生桔樓根和為丸如梧桐子大每服

四十九食後米湯飲下日夜再當服渴止十日已來
漸覺減即日兩服服三十五丸一月外每日一服服
三十九夏月即用蜜為丸服藥之次腹中忽冷痛即
取厚朴二兩去粗皮姜汁炙陳橘皮三分去白焙生
姜二兩切水二升煎取半升去滓分溫二服食久以飯
壓之如腹中不痛即止

梅花取香湯

出得生
堂方

又名斬龍劊子手消渴飲水至

石斗病極者可服之即瘥

天花粉 烏梅肉 人參 乾葛 枇杷葉 黃

蓍 枯樓子 麥門冬 五味子 各一兩 檀香 五錢

右為細末隨意不時水調服之

猪肚丸

出千金方

治諸渴疾

川黃連

五兩

淨白乾葛

知母

茯神

麥門冬

去心

大熟地

洗焙各二兩

枯樓根

粟米

各一兩

人參

半兩

右木臼中同搗為散入淨猪肚內縫密置甑內蒸極

爛乘熱再杵細若硬加少蜜為丸如梧桐子大蒸汁

下五十九或粥飲下

麥門冬散

出聖惠方

治消渴體熱煩悶頭痛不能食

麥門冬

二兩去心

茅根

二兩剉

枯樓

二兩

蘆薈

石膏

二兩

草

一兩微炙赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入小麥一百粒煎至

六分去滓不計早晚時候溫服

鐵粉散

出聖惠方

治消渴不止心神煩亂宜服此

鐵粉

一兩細研

麥門冬

二兩去心焙

牡蠣

一兩研為粉

知母

一兩

黃

連

二兩去翳

苦參

二兩剉

桔樓根

二兩金箔

一百片細研

銀箔

二百

研片細

右件藥搗細羅為散入鐵粉等同研令勻每服不計

時候以清粥飲調下一錢

鉛丹散

一名胡粉散

治瘡渴不止小便數兼瘡中心神悶

煩頭痛

出千金方

鉛丹

胡粉

各二兩

甘草

桔樓根

各十分

澤瀉

白

石脂

肘後作貝母

石膏

赤石脂

各五分

右為細末每服一錢用米湯調熱水調亦可量人羸壯服之食後臨卧如肚疼以漿水調或作丸一年病者一日愈二年病者二日愈渴甚者夜二服腹痛者減之丸服亦佳每服十九備急方云不宜酒不用麥汁下之古今錄驗云服此藥了經三兩日宜爛煮羊肚腹服之或作羹亦得宜湯淡食之候小便數鹹苦即宜服從蓉丸兼煮散將息亦治渴利患十年者拔葵調下

童子桑白皮湯

出三因方

治三消渴病或飲多利少或不

飲自利肌膚瘦削四肢倦怠常服補虛止渴利渴

有三消渴屬心內積煩愁心火炎上與暑熱或飲食
相挺而動消者屬脾有陰勝陽致成寒中者有陰不
勝陽成熟中者有狂陰興盛不交精泄成強中者消
腎屬腎少不謹惜壯乃腎衰多服丹石以致發唇焦
咽竭精益自泄不飲而利亦曰內消病亦危矣

童根桑白皮

即新種者去粗皮晒乾不焙

茯苓

人參

麥門

冬去心乾葛

乾山藥

桂心

各一兩

甘草

半兩生用

右剉散水一盞半煎至七分去滓溫服

麥門冬煎

出三因方

治諸渴病

麥門冬

去心

人參

黃耆

各二兩

白茯苓

山茱萸

山藥

桂心

各一兩半

黑豆

三分煮去皮別研

右為末地黃自然汁二碗牛乳二盞熬為膏丸如梧

桐子大大麥煮飲下五十丸

縮水丸

出楊氏家藏方

治消渴

甘遂

半兩用麩炒透裏黃褐色

黃連

去鬚一兩

右為細末水浸蒸餅為丸如菉豆大每服二丸薄荷湯送下不拘時候忌甘草三日

八味腎氣丸

一名八味丸
出三因方

治消渴小便多以飲水一

斗利小便反倍亦主婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息者如胞轉不得溺也以胞系反戾故致此病但利小便則愈

乾熟地

半斤

山藥

四兩

茯苓

牡丹皮

附子

桂心

各三
澤瀉四兩山茱萸五兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大酒送下二三十丸忌
猪肉冷水蕪荑胡荽千金地黃丸亦佳仲景云常服
去附子加五味子桃公云加五味子三兩茯苓四兩
張文云五味子茯苓各四兩肘後方云地黃四兩附
子澤瀉各一兩餘各二兩

先服八味腎氣丸訖後服此藥壓之

黃連

蜀者二十分

苦參粉 乾地黃

知母

各十分

牡蠣

煨八分 吳麥門冬去心十 枯樓七分

右為細末搗篩牛乳和為丸如梧桐子大併手作丸
曝乾油袋盛用漿水或牛乳下日再服二十九一方
服十五丸患重者渴瘥後更服一年以來此病特慎
麋鹿肉須慎酒炙肉鹹物喫素餅五日一頓細切精
羊肉勿著脂肥凡喫羊肉須著桑根白皮食一方云
瘥後須服此丸一載以上即永絕根源此病特忌房
室熱麵并乾補一切熱肉粳米飯李子等若覺渴熱

加至二十五丸亦得定後還依前減其方神效無比
餘並准前十方忌猪肉蕪荑

家寶方大救生丸

一名猪肚丸
出三因方

治理三瘡渴病日夜

飲水百盃不歇若飲酒則渴愈甚者專心服餌之數
日後見酒與水若仇頓爾口中津潤小便縮減五日
後小便赤色是病毒歸於下也或令人吐或腰背脚
膝疼痛或嘔逆惡心精神昏困此乃藥驗使病毒消
散也或有不傳於下者主生子母瘡或生於背或生

發鬢間五漏瘡並能致命俱服此藥至八九服其病
自除患人大忌酒色熱麵鹹物豚魚葱蒜炙燂等物
一百日病根永除三焦之疾自風毒酒色所傷於上
焦久則其病變為小便頻數其色如濃油上有浮膜
味甘甜如蜜淹浸之久諸虫聚食是惡候也此名瘡
渴中焦得此病謂之脾瘡喫食倍常往往加三兩倍
只好飲冷入口甚美早夜小便頻數腰膝無力小便
如泔日漸瘦弱此名瘡中也下焦得此病謂之瘡腎

腎宮日耗飲不多喫食漸少腰脚細瘦遺泄散盡手足久如柴形其疾已牢矣庸醫不識義理呼為癆疾或云下冷日久不見其痊病之久或變為水腫或發背瘡或足膝發為惡瘡至死不救

牡蠣

生用

苦參

生為末

枯樓

生用

知母

生為末

蜜陀僧

生用各一

兩

白蠟

研水銀

研八分

黃丹

半斤研

右為末男子患用末生子牡猪肚女人患用獾猪肚一箇貯藥以線縫合用繩子繫在新瓦磚上不令走

轉更用枯樓根半斤細切入在水中一處和礮煮早
辰至午取猪肚細切與諸藥末杵丸梧桐子大陰乾
空心米飲下三十九日三服家藏方用黑鉛與水銀
結砂不用蠟一方有天花粉半兩一方有灰坯無蜜
陀僧

參耆湯

出危氏方

治瘡渴

人參

去蘆

桔梗

去蘆

天花粉

甘草

各一兩

綿黃耆

鹽湯浸炙

白芍藥

各三兩

白茯苓

去皮

北五味子

各一兩半

右剉散每服四大錢水盞半煎八分日進四服留滓

合煎一方有木瓜乾葛烏梅三味

猪肚兒丸

一名黃連猪肚丸出如宜方

治瘡渴

猪肚

一具治如倉方

黃連

梁米

各五兩

桔樓根

白茯苓

各四兩

知母

二麥門冬二兩

右為末納猪肚中縫好安甑中蒸極爛乘熱入藥木

臼中搗可丸若硬加蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸日二加至五十丸渴即服一方加人參熟地黃乾

葛直指方用雄猪肚

黄耆湯

出直指方

治消渴

黄耆

茯神

桔樓根

麥門冬

去心各一兩

北五味

甘草

炙各半兩

生乾地黄

一兩半

右剉細每服四錢新水煎服

澄源丹

出三因方

治氣實血虛熱在上焦心煩燥渴引飲

無度小便數晝夜乃至一二十行有麤片狀者此疾

多得之飲啖炙煨日就羸瘦咽喉唇口焦燥呼吸少

氣不能多語兩脚瘦食倍於常不為氣力

牡蠣粉 苦參 蜜陀僧 知母 水銀

以白蠟半錢結

砂五味各一兩

枯樓根

一兩半

黃丹

一兩與水銀同研

右為末男用牡豬肚一箇女人用雌豬肚一箇入藥

在內以線縫定用繩縛在新磚別用生枯樓半斤切

碎同煮早辰至午時取藥出不用枯樓根只爛研豬

肚和藥為丸如梧桐子大每服三十粒食前米湯下

日三服十日可去病根

麥門冬湯

治消渴

生麥門冬

去心

苧根

切

小麥

各二升

蘆薈

切

枯薑

生薑

各五錢

石膏

研六分

右水二斗煮取六升去滓每服一升渴時任意飲未

瘥更作取利

茯苓湯

出千金方

治消渴陰脉絕胃反而吐食者

茯苓

八兩

澤瀉

四兩

白朮

生薑

桂心

各三兩

甘草

一兩

右咬咀水一斗煮小麥三升取汁三升去麥下藥煮

取二升半每服二合日再

六神湯

出仁存方

治三消渴疾

蓮房 乾葛

枇杷葉

去毛

甘草

炙

枯樓根

黃耆

各等分

右剉為散每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服小
便不利加茯苓

天花散

出直指方

治消渴

天花粉

生乾地黄

洗各一兩

乾葛

麥門冬

去心

北五

味子

各半兩

甘草

二分

右為麤末每服三錢粳米百粒同煎服

殊勝散

一名硃砂散出衛生家寶方

治痢渴

海浮石

烏賊魚骨

去甲丹砂

研水飛

虎杖

燒過各一兩

右為末渴時煎麥門冬調下二錢日午空心及夜臥時各進一服忌酒色濕麵油煎生冷鮓醬一方有人

參無葛根

桃紅散

出聖濟總錄

治痢渴

赤石脂

石膏

各研

栝樓根

剉

白赤脂

鉛丹

各一兩

甘草

炙半兩

右為細散冷水調下二錢

黃連丸

治消渴瘵中焦熱渴

苦參

一大斤

黃連

七分

栝樓

知母

牡蠣粉

麥門

冬

去心各五兩

右搗篩攪使勻以牛乳和併手捻丸如梧桐子大曝

乾日再服飽食訖以漿水下之服二十九如微利減

十九如食熟麵酒等即加服五九忌猪肉

六物丸

出聖惠方

治瘡渴熱中加減

桔樓根

八分

麥門冬

去心六分

知母

五分

人參

苦參粉

土瓜根

各四分

右為末牛膽和為丸如梧子大每服二十九日三服
麥粥汁下未知稍加至三十九咽乾者加麥門冬
乾加知母脇下滿加人參小便數加土瓜根隨患加之
各一分

易老門冬飲子

出拔
粹方

治老弱虛人大渴

人參

枸杞

白茯苓

甘草

各三兩

五味子

半兩

門冬

去心
五錢

右咬咀每服一兩一錢水一盞半生姜三片煎至七

分去滓溫服不拘時

瓜蒌散

出危
氏方

治盛壯之時不自謹惜恣情縱慾年長

腎氣虛弱因不能房事多服丹石真氣既孤舌唇乾

焦發渴精液洩小便赤黃大便秘實小便晝夜百十

行須當除熱補虛

白茯苓

去皮

天花粉

宣連

白扁豆

人參

去皮

石

膏 甘草節

寒水石

白朮

去皮

猪苓

各等分

右為末每服二錢熱湯調服立效

枯樓根散

出千金方

治瘡渴

枯樓根

麥門冬

鉛丹

各八分

茯苓

一作茯苓神

甘草

各六分

分

右為細末漿水服方寸匕日三外臺方無茯苓

烏梅木瓜湯

出三因方

治食過度中焦蘊熱煩渴枯燥小

便併多遂成痞中兼治瘴渴所謂瘴渴者北人往南

方受瘴多有此疾

木瓜乾

烏梅

打破不去仁

麥蘖

炒

甘草

草蓂

去皮各半

兩

右劉散每服四大錢水盞半姜五片煎七分去滓不

拘時服

烏梅五味湯

出聖惠方

治脬渴生津液

五味子

巴戟

酒浸去心

百藥煎

烏梅

甘草

各等分

右咬咀每服四錢水一盞空心煎服

茯苓丸

出聖惠方

治三消渴疾果有效

五倍子

去瓤四兩

蓮肉

一兩

龍腦

一兩半煨

左顧牡蠣

煨二兩

右用茯苓二兩為末煮糊丸如梧桐子大每服五十

丸空心鹽湯下仍兼服靈砂黑錫

黃連牛乳丸

出聖濟總錄

治消渴

黃連

去鬚一斤為末

麥門冬

去心二兩研爛

牛乳

地黃汁

葛

根汁

並一合

右合研衆手九如梧桐子大每服二十九空心粥飲

下日漸再加至四十丸

麥門冬散

出聖惠方

治脬渴不止宜服此

黃連

一兩炒令紫色

栝樓根

一兩

麥門冬

一兩去心焙

甘草

一兩炙微

赤劉赤茯苓

右為散入黃丹研令勻每服不計時候以溫水調下

一盞

人參散

出聖惠方

治瘡渴

鉛霜

半兩細研

黃連

半兩去積

枯樓根

半兩

人參

半兩去蘆頭

黃丹

半兩炒令紫色

右為散入研了藥令勻不計時候以溫水半盞下

枯樓丸

治瘡渴四肢煩熱口乾心燥宜服此

枯樓根

三兩

麥門冬

二兩去心焙

苦參

三兩分焙剉

人參

三分去蘆

頭知母三分

右為末用牛膽汁和丸如小豆大不計時候清粥飲

下二十九

銀寶丸

一名澄源丹

治消渴

方在本類

猪脊湯

出三因方

治三消渴疾

大棗

四十枚
去皮核

新蓮肉

四十粒
去心

西木香

一錢半

甘草

二兩

炙

右用雄猪脊骨一尺二寸同煎藥用水五碗於銀器煮去肉骨濾滓取汁一碗空心任意呷服忌生冷鹽等物以滓減去甘草一半焙乾為末米湯調服不以

時

人參散

一名參梅出
百一選方

治痢渴

牛鼻木

二箇洗淨細到男
患用雌女患用雄

甘草

人參

各半
兩

白梅

大者
十箇

右用水四碗煎至三碗濾去滓熱服為妙

化水丹

出濟生
拔粹

治手足少陰渴飲不止或心疼痛者

及消化水飲

川烏頭

大者四箇
炮去皮臍

甘草

炙三
兩

牡蠣

三兩
生用

蛤粉

六兩
用厚

者炮

右為細末醋浸蒸餅少糊為丸如梧桐子大每服十
九十五丸心痛者醋湯下其疾立愈

黃連膏

出濟生
拔粹

治瘡渴病

黃連末

一斤

生地黃

自然汁

白蓮花藕汁

各一斤

牛乳

一斤

右將汁熬成膏子搗黃連末為丸桐子大每服二十
丸少呷溫水送下進十服渴病立止

元骨飲

出聖濟
總錄

治瘡渴

猪脊骨

五寸

棗二十枚

甘草

微炙

乾姜

炮各半分

右吹咀水三升同煎至二升若發時量意加熱水服

生地黃膏

出危氏方

治渴證通用

生地黃

東如常棗大一椀

冬蜜

一椀 人參

半兩

白茯苓

去皮一兩

右將地黃洗切研細新水一碗調開同蜜煎至半次入參茯苓末拌和磁器密封匙挑服

清脾湯

出如宜方

治煩渴飲水小便赤

黃耆

白芷

升麻

人參

甘草

炙

半夏

製各半分

右哎咀每服四錢姜五片棗二枚煎食後服

猪苓散

此即五苓散

治消渴脉浮小便不利微熱者及病

欲水而復吐之為水逆冬時寒慄如瘧狀

猪苓 白朮

茯苓

各三分

澤瀉

五分

桂心

二分

右細搗篩水服方寸匕日三多飲暖水汗出即愈

滑石散

出聖惠方

治消渴嚔水漸多小便澁少皮膚乾燥

心神煩熱宜服此

蜜陀僧

半兩研

黃連

半兩去鬚

滑石

半兩細研

枯樓根

半兩

右為細末入研了藥不計時候用清粥飲調下一錢

黃連散

出聖惠方

治渴潤肺心

黃連

三兩淨為末

生地黄汁

三分

生栝樓汁

三合

牛乳

三合

右用三味汁相和每服三合不計時候調下黃連末

一錢

三黃丸

出千金方

治男子五勞七傷瘡渴不生肌肉婦人

帶下手足寒熱者治丹石毒及熱渴以意測度須大

實者方用

春三月

黃芩

兩四

大黃

兩三

黃連

兩四

夏三月

黃芩

兩六

大黃

兩一

黃連

兩七

秋三月

黃芩

兩六

大黃

兩二

黃連

兩三

冬三月

黃芩

兩三

大黃

兩五

黃連

兩二

右隨時加減搗為末以蜜為丸如大豆大米飲服五
九日二稍加至七九取下為已服一月病愈久服走
逐奔馬常試有驗效一本云夏三月不服

大黃甘草飲子

出宣
明論

治男子婦人一切瘡渴不能止

者

大豆

五升先煮三沸
淘出苦水再煮

大黃

一兩半

甘草

大粗者四兩
長四指打碎

右用水一桶將前藥同煮二五時如稠粳水少更添
煮豆軟盛於盆中俟冷令病人食豆渴食湯汁無時候
服食盡如渴止即已不止再煮前藥不三次病悉去
矣

川黃連丸

一名麥門冬
丸出直指方

治諸渴

川黃連

淨五兩

白天花粉

麥門冬

去心各
三錢半

右為末以生地黃汁并牛乳汁夾和搗丸如梧桐子大
每服三十九粒米湯飲下一方無生地黃汁牛乳用
麥門冬搗勻為丸食後煎麥門冬湯下

硝石散

出聖濟
總錄

治三消渴疾

硝石 葛根

鉛霜

各一
兩

右為細末每服一錢冷水調下

澄水飲

出聖濟
總錄

治消渴

銀餅內湯

煎

水萍

焙

葛根

劉各
等分

右各件粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一半去滓
溫服

鉛黃散

出聖惠方

治瘡渴不止

水銀

三兩先鎔鉛旋入水銀候鉛面上有花
上便以鐵匙掠取於乳鉢內研細

皂莢

一挺

不蛀者塗酥炙令黃去皮
子入麝香一錢同研為末

鉛一
斤

右為散每抄皂莢末一錢水一中盞煎至六分去滓
飲食後調下鉛黃散半錢服之

浮石散

出本
事方

治瘡渴

浮石

舶上青黛

各等分

麝香

少許

右為細末每服一錢溫湯調下

枳椇子丸

出危氏方

治飲酒多發積為酷熱蒸薰五臟津

液枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專嗜冷物寒漿

枳椇子

二麝香一兩錢

右為末麵糊丸如梧桐子大每服三十九空心鹽湯

吞下

三神湯

出危氏方

治證同前

烏梅肉

遠志

去心甘草水煮過却以姜汁拌炒各一兩

枳實

去瓢一兩

夏加黃連

五錢春秋冬不用

右剉散每服四錢水二盞糯米根一握煎至七分去滓不拘時候溫服若無糯米白茅根亦可如無白茅稗繩代之亦可

牡蠣散

出聖惠方

治瘡渴潤肺

白羊肚

一具切牡蠣三兩燒乾為粉

胡燕窩中草

燒灰一兩

右為散每服於食後以新汲水調下三錢

龍鳳丸

出危氏方

治瘡渴

鹿茸

火燎去毛一兩酒浸炙

山藥

兔絲子

酒浸各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下濃煎人參湯亦可一方麴糊丸鹽酒湯下名龍肝

鳳髓丸

浮萍丸

出千金方

治瘡渴

乾浮萍

枯樓根各等分

右為末以人乳汁為丸如梧桐子大空腹飲服三十

九日三三年病者三日愈治虛熱大佳

百日還丹

出儒門事親

治瘡渴

佛茄子

撞柳根

各等分

右為末枸杞汁和為丸如雞頭大每服九數加減新

水送下

烏金散

出三因方

治熱中多因外傷燥熱內用意傷脾飲

啖肥膩熱積胸中致多食數洩小便過於所飲亦有

不渴而飲食自消為小便者

黃丹

炒細墨燒各一兩

右研勻每服三錢食後先用水一兩碗漱口待心中熱索水便以冷水調下

止渴丸

專止渴

黃連

二兩無名異一兩

右為細末用蒸餅打糊為丸菜豆大每服百丸用茄根鹽殼煎湯送下姜湯亦得

竹龍散

出三因方

治消渴

五靈脂

黑豆

生去皮
各半兩

右為散每服二錢煎冬瓜湯調下無冬瓜即用冬瓜苗葉子煎湯俱可一日二服小渴只一服差渴定後不可服熱藥唯宜服八味丸仍更宜用五味子代附子

冬瓜飲

一名黃瓜湯
出十便良方

治消渴熱盛心神煩亂及飲水

小便如脂日夜無度

大冬瓜

一枚

黃連

去鬚
半斤

右先搗黃連為末將冬瓜三停中截去一停取二停
淨去瓢子納黃連末於冬瓜中取截下一頭蓋却搜
白麵厚裹冬瓜令徧即更以黃土破泥裹一重候微
乾坐瓜在炭火中四面簇炭火燒令泥赤即止候冷
打去泥并剝去麵搗開瓜頭裏面有黃連汁不限多
少濾過每服一盞渴即飲之立瘥未瘥更作一服冬
瓜皮肉晒乾兼治骨蒸勞及酒黃多年者為散每於
食後溫水調下二錢甚效

枯樓根

出聖濟
總錄

治因好食熱麵炙肉及服補治熱藥

并乳石三焦氣隔心肺乾熱口乾舌焦飲水無度小

便日夜不知斗數心欲狂亂服此救急止渴

枯樓

一枚黃熟者去
皮用熟并子

冬瓜

一枚中樣者割破頭納
枯樓熟子在冬瓜心內

右用黃土泥裹冬瓜令勻可半指厚候乾簇炭火燒令

泥通赤即止去泥取瓜就熟切碎爛研布絞取汁約

七八合更入白蜜兩匙頭攪令調勻候稍冷即分三

度臟腑熱歇即不思水自無小便如不是枯樓熟時

節燒冬瓜令服

人參煎

出聖濟
總錄

治消渴

人參

一兩
二兩 葛根

右為末每發時須得煇猪湯一升已來入藥末三錢
又入蜜二兩同一處於鐺子內慢火熬之至三合以
來似稠黑餚便取出於新磁器內每夜飲後取一匙
頭含化嚙津重者不過三服

硃砂黃連丸

出醫方
集成

治心虛蘊熱或因飲酒過多發

為瘡渴

硃砂

一兩
另研

宣連

二兩

生地黄

三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九燈心棗湯下

神白散

出儒門
事親

治真陰素被損虛多服金石燥熱之

藥或嗜煇炙鹹物遂成瘡渴之疾

桂府滑石

六兩

甘草

一兩
生用

右為末每服三錢溫水調下或大渴欲飲冷者以新

汲水調

雙補丸

出仁存方

治渴補養氣血

五味子

兔絲子

酒浸炒

右等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服三四十粒空

心米湯飲吞下

茯神湯

一名黃耆湯

治消渴

方見本門胃熱渴類

人參湯

出聖濟總錄

治消渴初因酒得

人參 甘草

半生半炙各一兩

右粗搗篩用燀猪水煮滓澄清取五升同煎至二升半
去滓渴即飲之永瘥

麵餅丸

一名神效丸又名神
授丸出楊氏家藏方

治瘡渴有驗

蜜陀僧

一兩別
研極細

川黃連

一兩為
細末

右用蒸餅丸如梧桐子大每服五丸煎蠶殼茄根湯
下卧時服次日加至十丸以後每日五丸至三十丸
止服藥後以見水惡心為度即住服不過五六服必
效若覺惡阻每日食乾物壓之旬日後自定奇甚奇

甚蠶空是出蠶蛾子空蠶殼一方為細末每遇渴時
抄一字於舌上以水下之經驗方陳氏云昔沈德和
帥西蜀時得此方偶然其壻章木苦斯疾服之數日
頓愈余得於章屢試有效記得向有一客病此疾宿
疾逆旅終夜求水不得偶釜中有湯酌而沃其渴即
止旦起視之乃繅蠶湯也近授閩州權軍任忠裕即
日而差

內金散

出經驗良方

治瘡渴日飲水一石小便不禁

雞內金

即雞肚內黃

菠薐根

各等分

右為末米飲調服二錢

黃連丸

一名熱痢丸
出十便方

治患熱痢渴常服有驗

豉心

二兩以鹽醋拌蒸晒
乾如此者三熬微黃

川黃連

三兩

右為細末蜜和為丸每日空腹服二十五丸食後服
二十九取烏梅十顆水二小升煎之數沸取湯下前
件丸藥如無烏梅以小麥子二升煮取汁替亦得一
方忌猪肉一方用胡黃連

治渴小便利復非淋者

出千
金方

榆白皮

二斤
切

右以水一斗煮取五升每服三合日三

又方

出千
金方

薔薇根

一把

右水煎服之佳肘後方以治睡中遺尿

又方

出千
金方

鵲巢

三年
重者

右燒末以飲服之肘後方以治睡中遺尿

又方

出千金方

桃膠

右丸如彈子大含之咽津

又方

出千金方

蠟

如雞子大

右以酢一升煮二沸適寒溫頓服之

又方

出千金方

小豆藿一
把

右搗取汁頓服三升

治瘡渴熱或心神煩亂

出聖
惠方

黍米泔

右用一大盞溫服之

水火既濟丸

出得生堂
經驗方

治上盛下虛心火炎燥腎水

枯竭不能交濟而成渴證此藥主之

黃連

一
斤 白茯苓

一
斤

右為細末熬天花粉水作麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸溫湯送下不拘時候

黃瓜根丸

出聖惠方

治消渴熱或心神煩亂宜服此藥

黃瓜根三兩黃連三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服於食後以溫水送

下二十九丸

兔骨飲

出仁存方

治消渴羸瘦小便不禁

兔骨

一具微炙黃搗碎

大麥苗

二斤

右以水一斗煮取汁五升每服一小盞日三兩服又宜食兔肉

棘枸子散

出百一選方

治消渴

眉山楊穎臣長七尺健飲啖侗儻人也忽得消渴疾日飲水數斗食倍常而數溺渴藥服之逾年疾日甚自度必死治棺余囑其子延良醫張肱隱之子不記其名為診脉笑曰君幾誤死取麝香當門子以酒濡之十許丸用棘枸子作湯吞之遂愈問其故張云消

渴痛中皆脾弱腎敗上不節陽水腎水不上升乃成
此疾今穎臣脾脉極熱下腎不衰當由果實與酒過
度熱在脾所以飲食過人而多飲水飲水既多不得
不多溺非痛渴也麝香能敗酒果瓜花棘枸亦勝酒
屋外有此木屋內釀酒不熟以木為屋屋下亦不成
釀故以此二物為藥以去果酒之毒也以其實如雞
距別鷄來巢今俗謂之雞距亦謂之癩漢指頭蓋取
其似也食之如牛乳小兒喜食之本草木部作枳椇

普濟方卷一百七十六